

Klausur der Modulprüfung / Diplomvorprüfung

für B.Sc. aer / B.Sc. mawi / Dipl. aer / Dipl. geod. / Dipl. autip

Bitte beachten Sie die folgenden **Hinweise**:

- Bearbeitungszeit: 120 Minuten
- Erlaubte Hilfsmittel: **10 Seiten DIN A4 eigenhändig beschrieben.**
- Bearbeitungen mit Bleistift, Grün- oder Rotstift sind nicht zulässig!
- Lesen Sie zunächst die Aufgabenstellungen aufmerksam durch und beachten Sie, dass je nach Lösungsweg die gegebenen Hinweise hilfreich sein können.
- In den **Aufgaben 4 – 6** sind die vollständigen Lösungswege mit allen notwendigen Begründungen anzugeben. Die Bearbeitung der Aufgaben nehmen Sie bitte auf gesondertem Papier vor. Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und schreiben Sie auf jedes Blatt ihren Namen und die Matrikelnummer.
- In den **Aufgaben 1 – 3** werden nur die Endergebnisse gewertet. Diese sind in die vorgegebenen Kästen einzutragen. Nebenrechnungen sind hier nicht verlangt und werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt.
- Die Prüfungsergebnisse werden voraussichtlich ab dem 04.05.2011 über das Studenteninformationssystem der Universität Stuttgart (<https://lsf.uni-stuttgart.de/>) bekannt gegeben.
- Die Klausureinsicht wird voraussichtlich am 06.05.2011 stattfinden, Ort und Uhrzeit werden auf www.mathematik.uni-stuttgart.de/studium/infomat/HM3-Kuehnel-WS1011/ bekannt gegeben.

VIEL ERFOLG!

Hinweise für Wiederholer:

Studierende, die diese Prüfung als Wiederholungsprüfung schreiben, werden darauf hingewiesen, dass zu dieser Wiederholungsprüfung für bestimmte Fachrichtungen eine mündliche Nachprüfung gehört, es sei denn, die schriftliche Prüfung ergibt mindestens die Note 4,0.

Wiederholer, bei denen eine mündliche Nachprüfung erforderlich ist, müssen sich **persönlich** vom 11.05.2011 bis zum 13.5.2011 bei Marcel Bliem (V57 8.155, bliem@mathematik.uni-stuttgart.de) einen Termin hierfür geben lassen. Eine individuelle schriftliche Benachrichtigung erfolgt nicht! Sie sind verpflichtet, sich rechtzeitig über das Ergebnis der schriftlichen Prüfung zu informieren und sich ggf. zum vereinbarten Zeitpunkt für die mündliche Nachprüfung bereitzuhalten.

Mit Ihrer Teilnahme an dieser Prüfung erkennen Sie diese Verpflichtungen an.

Die mündlichen Nachprüfungen finden vom **24.05.2011 bis 26.05.2011** statt.

Name, Vorname	Matrikelnummer	Studiengang

Aufgabe 1 (1 + 1 + 1 + 2 + 2 = 7 Punkte)

Geben Sie bei den folgenden Aussagen an, ob Sie wahr oder falsch sind. Für jede falsche Antwort gibt es einen Punkt Abzug, die Aufgabe kann aber insgesamt nicht mit weniger als 0 Punkten bewertet werden.

- (a) Für jede stetige Funktion $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ und jeden Punkt (x_0, y_0) ist die Differentialgleichung der Form

$$y'(x) = F(y(x), x), \quad y(x_0) = y_0$$

eindeutig lösbar.

- (b) Für jede stückweise stetige, periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert ihre Fourierreihe an jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ gegen $f(x)$.

- (c) Für zwei unabhängige reelle Zufallsvariablen X, Y gilt $E(X \cdot Y) = E(X)E(Y)$.

- (d) Die Differentialgleichung

$$xy^2 - x^2yy' = 0$$

ist exakt.

- (e) Die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}, & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{1}{4} \text{ und } y \in [0, 1], \\ \frac{5}{6}, & \text{für } \frac{1}{4} < x \leq 1 \text{ und } y \in [0, 1], \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

besitzt alle Eigenschaften einer Wahrscheinlichkeitsdichte auf \mathbb{R}^2 .

Aufgabe 2 (7 Punkte)

Sei

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, y \geq 0, z \geq 0\}.$$

Berechnen Sie das folgende mehrdimensionale Integral in Kugelkoordinaten

$$\vec{x}(r, \varphi, \vartheta) = (r \cos \varphi \sin \vartheta, r \sin \varphi \sin \vartheta, r \cos \vartheta).$$

Fassen Sie den Integranden soweit wie möglich zusammen, bevor Sie ihn eintragen.

$$\int_D (x^2 + y^2 - z^2) dV = \int_{r=\square}^{\square} \int_{\varphi=\square}^{\square} \int_{\vartheta=\square}^{\square} \boxed{} d\vartheta d\varphi dr$$

$$= \boxed{}$$

Aufgabe 3 (5 + 3 = 8 Punkte)

(a) Gegeben ist das Anfangswertproblem

$$y' = -\frac{e^{-2\frac{y}{x}}}{x} + \frac{y}{x}, \quad y(2) = 0.$$

Substituieren Sie $u = yx^{-1}$ und geben Sie die Differentialgleichung für u an.

$$u'(x) = \boxed{}$$

Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$y(x) = \boxed{}$$

(b) Bestimmen Sie die allgemeine reelle Lösung zu

$$y''' - 2y'' + y' = 0$$

$$y(x) = \boxed{}$$

Aufgabe 4 (2 + 6 + 5 = 13 Punkte)

Gegeben ist der Körper

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 2, z \geq 0, y^2 - 2y + z^2 \leq 8\}.$$

- (a) Was ist K für ein Körper? Fertigen Sie eine Skizze an.
- (b) Bestimmen Sie eine Parametrisierung des Körpers K und berechnen Sie dessen Masse m_K für die Dichteverteilung

$$\rho_K(x, y, z) = x + y - 1.$$

- (c) Bestimmen Sie den Fluss des Vektorfeldes

$$\vec{X} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}x^2 \\ yz^2 - x^3z - x^2z^2 \\ z(y-1)^2 - x^3 \end{pmatrix}$$

durch die Oberfläche von K nach außen.

Hinweis: Die Menge

$$Z = \{(x, y, z) : y^2 + z^2 \leq r^2\}$$

ist der Vollzylinder mit Radius r um die x -Achse.

Aufgabe 5 (5 + 3 + 4 = 12 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{für } -\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}, \\ x, & \text{für } -\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{für } \frac{\pi}{2} \leq x < \pi. \end{cases}$$

- (a) Bestimmen Sie die reelle Fourierreihe von f . Ausdrücke der Form $\cos(\frac{k\pi}{2})$ oder $\sin(\frac{k\pi}{2})$ müssen an dieser Stelle nicht ausgewertet werden.
- (b) Welchen Wert nimmt die Fourierreihe bei $x_1 = 0$, $x_2 = -\frac{\pi}{2}$ und $x_3 = \frac{\pi}{2}$ an?
- (c) Bestimmen Sie den Wert der Reihe

$$\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)^2}$$

durch Auswerten der Fourierreihe bei $x = \frac{\pi}{2}$.

Hinweis: Es gilt für $k \in \mathbb{N}_0$

$$\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{und} \quad \sin^2\left(\frac{k\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0, & \text{für } k = 0, 2, 4, \dots, \\ 1, & \text{für } k = 1, 3, 5, \dots \end{cases}$$

Aufgabe 6 ($4 + 5 + 4 = 13$ Punkte)

In einem Binnenmeer befinden sich vier Arten von Fischen. 50% aller Fische sind rot, 25% aller Fische sind schwarz, 15% aller Fische sind gelb und 10% aller Fische sind grün.

- (a) Die schwarzen Fische gelten als Delikatesse. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind bei einem Fang von 1200 Fischen mehr als 279 schwarz?
- (b) Ein Fischer fängt 400 Fische. Geben Sie ein Intervall an, in dem mit 95% Wahrscheinlichkeit die Anzahl der gefangenen roten Fische liegt.
- (c) Die grünen Fische sind vom Aussterben bedroht. Wie viele Fische muss man mindestens fangen, um mit 84% Sicherheit zu sagen, dass noch mindestens 4% grüne Fische im Binnenmeer leben.

Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass die Gesamtzahl der Fische im Meer sehr groß gegenüber der Anzahl der gefangenen Fische ist, und benutzen Sie den zentralen Grenzwertsatz.

Ausgewählte Näherungswerte der Verteilungsfunktion $\Phi_{0,1}(z)$ für die Standardnormalverteilung

z	,00	,01	,02	,03	,04	,05	,06	,07	,08	,09
1,0	,8400	,8438	,8461	,8485	,8508	,8513	,8554	,8577	,8529	,8621
1,1	,8643	,8665	,8686	,8708	,8729	,8749	,8770	,8790	,8810	,8830
1,2	,8849	,8869	,8888	,8907	,8925	,8944	,8962	,8980	,8997	,9015
1,3	,9032	,9049	,9066	,9082	,9099	,9115	,9131	,9147	,9162	,9177
1,4	,9192	,9207	,9222	,9236	,9215	,9265	,9279	,9292	,9306	,9319
1,5	,9332	,9345	,9357	,9370	,9382	,9394	,9406	,9418	,9492	,9441
1,6	,9452	,9463	,9474	,9484	,9495	,9505	,9515	,9525	,9535	,9545
1,7	,9554	,9564	,9573	,9582	,9591	,9599	,9608	,9616	,9625	,9633
1,8	,9641	,9649	,9656	,9664	,9671	,9678	,9686	,9693	,9699	,9706
1,9	,9713	,9719	,9726	,9732	,9738	,9744	,9750	,9756	,9761	,9767